
NORMALISATION D'UNE RÉTROVERSION UTÉRINE EN EXTERNE

Module 1 – Cours 34

TECHNIQUE EXTERNE EN VENTOUSE ★★★★★

1. Indication

Réduction d'une rétroversion utérine sur un abdomen difficilement dépressible, en utilisant la flexibilité de l'utérus. Faire impérativement un lift de l'intestin grêle avant cette correction.

2. Position du sujet

La patiente est en décubitus dorsal, jambes en crochet, le praticien est sur le côté droit, la table légèrement en position décline. Le praticien palpe la position de l'utérus qui se trouve en profondeur, corps utérin difficilement palpable.

3. Premier temps

Le praticien par son index caudal prend un contact avec la face antérieure du corps utérine et le pousse vers le sacrum. Pendant ce temps la main placée sur l'abdomen exécute de légères pressions circulaires.

4. Deuxième temps

Le praticien maintient par son index le corps de l'utérus vers le sacrum et la main abdominale, déprime au maximum le péritoine et aide l'utérus à exécuter un mouvement de bascule postérieure.

5. Troisième temps

Les deux mains sont retirées brusquement, cette "ventouse" amène l'utérus en haut et en avant.



NORMALISATION EN VENTOUSE D'UN UTÉRUS RÉTROVERSÉ